

*** THÔNG BÁO NGAY CHO CÁN BỘ Y TẾ
BẤT CỨ BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG NÀO CỦA TRẺ.**

Đưa NGAY

Trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng trẻ có các dấu hiệu như: Sốt cao ($\geq 39^{\circ}\text{C}$), co giật, trẻ khóc thét, quấy khóc kéo dài, li bì, mệt lả, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường khác hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng.



3. Nếu cha mẹ không yên tâm về sức khỏe của con mình sau khi tiêm chủng có thể đưa trẻ đến gặp cán bộ y tế để được khám và tư vấn.

Hướng dẫn THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC TRẺ SAU TIÊM CHỦNG



SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
NĂM 2024

TIÊM CHỦNG VẮC XIN CHO TRẺ:

Những năm đầu đời trẻ em rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm như: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn *Haemophilus influenzae* týp b (Hib), Bại liệt, Lao, Sởi, Rubella, Viêm não Nhật bản B và chăm sóc mà còn có thể dẫn đến tử vong hoặc bị các di chứng suốt đời như liệt, các biến chứng về thần kinh, viêm gan mãn...




Tiêm chủng vắc xin là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ khỏi mắc các bệnh nguy hiểm trên, nhưng cũng có thể xảy ra các phản ứng không mong muốn.

Hầu hết đó là các phản ứng thông thường, biểu hiện nhẹ và có thể tự khỏi như: Ngứa, đau, sưng đỏ tại chỗ tiêm, sốt dưới 39°C, khó chịu, mệt mỏi, chán ăn.

Phản ứng nặng sau tiêm chủng rất hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra.

Vì vậy cần được phát hiện, xử trí kịp thời và theo dõi, chăm sóc tại cơ sở y tế.



Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, phát hiện và xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng nếu có, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ cần tuân thủ các hướng dẫn sau:

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trước khi tiêm chủng, cần chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của trẻ như: tiền sử sinh đẻ, tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng, nhất là trẻ có tiền sử phản ứng mạnh với liều tiêm vắc xin trước; tình trạng sức khỏe của trẻ hiện tại, trẻ có bị bệnh hay đang dùng thuốc gì không; tiền sử dị ứng của các thành viên trong gia đình...



2. Sau khi tiêm chủng:

- Cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra.

- Tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng về các dấu hiệu như: toàn trạng, tinh thần, tình trạng bú mẹ, ăn, ngủ; dấu hiệu về nhịp thở; nhiệt độ, phát ban; biểu hiện tại chỗ tiêm như sưng, đỏ...

- Cần cho trẻ bú mẹ hoặc uống nước nhiều hơn. Bế, quan sát trẻ thường xuyên và chú ý không chạm, đè vào chỗ tiêm. Nếu trẻ sốt, cần phải cặp nhiệt độ và theo dõi, dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế. Không đắp bất cứ thứ gì lên vị trí tiêm.



ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ